

Zona óptima



Fechas de siembra por zona

| Subregiones | MAYO | | | JUNIO | | | JULIO | | | ACOSTO | | |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |
| 15-16-14-13 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 17 | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 2-7-1-8-9 | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 6-3 | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 4 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 5-10 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |

Características varietales

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Porte vegetativo | semierecto |
| Altura de planta | 85 cm |
| Vuelco | resistente |
| Frío en pasto | susceptible |
| Capacidad de macollaje | media |
| Desgrane | resistente |
| Vernalización | sin requerimientos |
| Grupo de calidad | 2 (revisión CONASE) |
| Respuesta a la fertilización | muy alta |
| Ciclo | corto |

Densidad (plantas logradas por m²)



En fecha de siembra óptima: 320-360




En fecha de siembra límite: 360-380

Perfil Sanitario

Roya de la hoja



Roya del tallo



Roya amarilla



Drechslera



Septoria



Tizón bacteriano



Fusarium



■ muy buen comportamiento
 ■ intermedio -bueno
■ intermedio
 ■ intermedio-bajo
 ■ susceptible

Nueva variedad de ciclo corto con alto potencial de rinde, calidad comercial y adaptabilidad a distintas zonas.

ARCE